

Plonowanie jęczmienia ozimego PDOiR K
województwo śląskie zbiór 2011 r.
(dt/ha, wilg. 14%)

L.p	Odmiana	COBORU SDOO w Pawłowicach		ZDOO w Kochcicach		MHR-HBP Nieznanice		Zakład Hodowli Roslin Modzurów		Średnia w dt/ha		Różnica średniej a2-a1
		a1	a2	a1	a2	a1	a2	a1	a2	a1	a2	dt/ha
1	Souleyka	84,0	90,1	81,8	89,9	99,6	102,2	107,8	125,1	93,3	101,8	8,5
2	Maybrit	80,7	88,8	68,3	83,8	107,8	113,5	107,5	114,6	91,1	100,2	9,1
3	Nickela 2 rz.	82,6	89,4	73,9	76,8	82,7	90,8	102,2	110,9	85,3	92,0	6,6
4	Rosita	83,8	89,2	73,9	78,4	106,4	109,7	100,2	116,4	91,1	98,4	7,4
5	Fridericus	90,5	95,1	74,1	86,7	96,6	105,1	97,38	107,2	89,7	98,5	8,9
6	Karakan	72,4	83,2	75,2	85,8	102,7	106,3	94,7	110,3	86,3	96,4	10,1
7	Scarpia	88,6	92,0	77,2	85,5	106,1	111,9	115,2	116,9	96,8	101,6	4,8
8	Amarena	77,4	85,5	69,6	82,5	104,1	108,6	99,8	110,3	87,7	96,7	9,0
9	Wintmalt 2 rz.	77,2	86,2	82,5	90,1	98,1	104,2	97,1	106,9	88,7	96,9	8,1
10	Laverda	83,1	92,9	76,3	84,5	94,4	102,6	97,6	116,9	87,9	99,2	11,4
11	Merle	81,3	92,4	85,4	85,4	101,1	108,1	102,6	122,3	92,6	102,0	9,5
12	Metaxa	82,6	87,2	77,2	83,8	85,6	87,5	92,7	108,1	84,5	91,7	7,1

A₁ - przeciętny poziom agrotechniki

A₂ - wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie
azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona fungicydowa,
regulator wzrostu)

Zestawiła: Weronika Jaksik

27.07.2011 r.